

Aspirin® C (Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbicum), tabletki musujące, 1 tabletka zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg witaminy C oraz substancje pomocnicze. Jedna tabletka musująca zawiera 467 mg sodu. **Wskazania:** Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. **Dawkowanie i sposób stosowania:** Dorośli jednorazowo 1-2 tabletki, co 4-8 godzin (nie więcej niż 8 tabletek na dobę). Młodzież powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza 1 tabletkę, co 4-8 godzin (nie więcej niż 3 tabletki na dobę). Nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem. Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, nerek. Tabletki przyjmować doustnie, rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy po podaniu salicylanów lub substancji o podobnym działaniu (NLPZ) w wywiadzie, ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek, stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ostatni trymestr ciąży, dzieci poniżej 12 lat, kamica nerkowa, hiperoksaluria, hemochromatoza. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:** Nie stosować w 1. i 2. trymestrze ciąży bez bezwzględnej konieczności; Ostrożnie: podczas karmienia piersią, przy nadwrażliwości na NLPZ lub inne substancje alergizujące, podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby, nerek lub zaburzeniami krążenia, chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie, w niedoborze dehydrogenazy glukozy-6 fosforanowej. U pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, katarą siennym lub polipami błony śluzowej nosa, a także uczulonych na inne substancje może wystąpić skurcz oskrzeli, napad astmy lub inna reakcja nadwrażliwości. Może dojść do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego może wywołać napad dny moczanowej. U dzieci i młodzieży z infekcją wirusową istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a (wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej; objawem mogą być uporczywe wymioty). U dzieci poniżej 12 lat produktów zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować, a u młodzieży powyżej 12 lat produkty zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza. Może wpływać negatywnie na płodność kobiet. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Stosować ostrożnie u pacjentów chorych na szczawianowo-wapniową kamice nerkową lub nawracającą kamice nerkową. Produkt zawiera 467 mg sodu w jednej tabletce musującej, co jest równoważne 23% zalecanej dawki dobowej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Należy wziąć to pod wagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. **Działania niepożądane:** zaburzenia żołądka i jelit: bóle żołądka i brzucha, zgaga, biegunka, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja, enteropatia zwężeniowa jelit (szczególnie podczas długotrwałego stosowania); zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: w rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz); zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania; zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki, krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Na skutek krwawień niedokrwistość z niedoboru żelaza albo ostra niedokrwistość pokrwotoczna (objawy: astenia, bledność, hypoperfuzja, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych), hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy G6PD; zaburzenia naczyńiowe: wylew krwi do mózgu, potencjalnie zagrażający życiu; zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia czynności nerek i ciężkie uszkodzenie nerek; zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych takie jak: zaostrzenie choroby układu oddechowego, która nasila się po zażyciu kwasu acetylosalicylowego, reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny; zaburzenia układu oddechowego: astma oskrzelowa. **Pozwolenie nr: R/1928. Podmiot odpowiedzialny:** Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, www.bayer.com.pl. **Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.** V8/31.07.2025/MJ