

Aspirin® C Forte (Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbicum), tabletki musujące, 1 tabletka zawiera 800 mg kwasu acetylosalicylowego i 480 mg witaminy C oraz substancje pomocnicze. Jedna tabletka musująca zawiera 438 mg sodu. **Wskazania:** Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym lub umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. **Dawkowanie i sposób stosowania:** Dorośli jednorazowo 1 tabletkę, w razie konieczności dawkę jednorazową można powtarzać co 4-8 godzin (nie więcej niż 3 tabletki na dobę). Nie należy stosować dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować u dzieci i młodzieży z uwagi na ilość substancji czynnych w jednej tabletce musującej. Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, nerek. Tabletki przyjmować doustnie, rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy po podaniu salicylanów lub substancji o podobnym działaniu (NLPZ) w wywiadzie, ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek, stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ostatni trymestr ciąży, u dzieci i młodzieży, kamica nerkowa, hiperoksaluria, hemochromatoza. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:** nie należy stosować produktów zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne, przy nadwrażliwości na NLPZ i leki przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby, nerek lub zaburzeniami krążenia, chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie, w niedoborze dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej, w okresie karmienia piersią. Może wpływać na płodność u kobiet. U pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, katarem siennym lub polipami błony śluzowej nosa, a także uczulonych na inne substancje może wystąpić skurcz oskrzeli, napad astmy lub inna reakcja nadwrażliwości. Może dojść do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego może wywołać napad dny moczanowej. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży. Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Stosować ostrożnie u pacjentów chorych na szczawianowo-wapniową kamicę nerkową lub nawracającą kamicę nerkową. Produkt zawiera 438 mg sodu w jednej tabletce musującej, co jest równoważne 22 % zalecanej dawki dobowej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów będących na diecie ubogosodowej. **Działania niepożądane:** zaburzenia żołądka i jelit: bóle żołądka i brzucha, zgaga, biegunka, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja, enteropatia zwężeniowa jelit (szczególnie podczas długotrwałego stosowania); zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: w rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz); zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania; zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (krwotok zabiegowy, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Na skutek krwawień niedokrwistość z niedoboru żelaza albo ostra niedokrwistość pokrwotoczna objawiająca się astenią, bladością, hypoperfuzją a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych, hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących z powodu poważnej postaci niedoboru dehydrogenazy G6PD; zaburzenia naczyniowe: wylew krwi do mózgu potencjalnie zagrażający życiu; zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia czynności nerek i ciężkie uszkodzenie nerek; zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych takie jak: zaostrzenie choroby układu oddechowego, która nasila się po zażyciu kwasu acetylosalicylowego, reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny; zaburzenia układu oddechowego: astma oskrzelowa. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. **Pozwolenie nr: 22290. Podmiot odpowiedzialny:** Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa **Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.** V4/31.07.2025/MJ